



Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling

Listen har virkning fra den 16. december 2019

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder.

Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

A. Behov for tæt styring af medicineringen

En korrekt anvendelse af lægemidlet forudsætter indgående kendskab til patienten samt en omfattende viden om lægemidlet og sygdommen. Denne viden besiddes kun af en specialafdeling. En patient, som lægefagligt kan vurderes som egnet til at blive fulgt fra egen læge eller speciallæge, forudsættes afsluttet til eventuel viderebehandling i primærsektoren.

B. Lægemidler fremstillet specielt til den enkelte patient

Lægemidler der ikke er standardpræparerter og som det vil være unødig besværligt for patienten at skulle rekvirere fra et privat apotek. Lægemidlerne fremstilles typisk kun på sygehusapoteker.

C. Udlevering i henhold til særlige beslutninger

Regeringen har i flere tilfælde klargjort, at bestemte lægemidler skal udleveres vederlagsfrit til ikke indlagte patienter. Det drejer sig om:

- 1) Kytril, Zofran, Vogalene og andre kvalmestillende midler, der anvendes til cancerpatienter.
- 2) Parenteral ernæring til patienter med svært korttarmssyndrom.
- 3) Samtlige udgifter til hjemmedialyse.

D. Lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfri i en begrænset periode på ca. to år til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb samt til psykiatriske patienter med dom til behandling, selvom disse patienter ikke er indlagt. Ligeledes gælder det patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling.

De sidste nævnte grupper med patienter der er underlagt retslige foranstaltninger omfatter patienter med skizofreni, skizoaffektive psykoser, bipolar affektive sindsdelser og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet). Vederlagsfri medicin kan udleveres svarende til dommens længde. Udleveringen af vederlagsfri medicin skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:

- 1) Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/ Behandlingspsykiatrien,
- 2) behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/ behandlingspsykiatrien eller
- 3) Hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre.

E. Patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven (Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien)

Patienter, der i henhold til psykiatriloven efter udskrivning kan afhentes uden for sygehusregi og bringes ind på psykiatrisk afdeling til tvangsmedicinering, kan få medicin omfattet af listen udleveret vederlagsfrit.

F. Udlevering til kortvarig behandling af akutte potentiel livstruende sygdomme

Patienter med behov for kortvarig antitrombotisk behandling i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (efter individuel vurdering) skal efter dette kriterium fremover have mulighed for at modtage antitromboselægemidler i op til 35 dage vederlagsfrit. Dette gælder ligeledes patienter i behandling med antitrombotiske lægemidler i tilknytning til obstetrisk behandling (såvel profilaktisk behandling som behandling af eksisterende tromboser) i op til 6 uger efter fødsel.

G. Udlevering til patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram

Det er med Kræftplan III aftalt, at alle borgere i alderen 50 – 74 år skal tilbydes screening for tyk- og endetarmskræft begyndende fra 2014. De omhandlede patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med deltagelse i tarmkræftscreeningsprogrammet kan få udleveret lægemidlet Moviprep.

H. Behandling af infektion erhvervet under hospitalsindlæggelse

Patienter kan efter dette kriterium få udleveret vederlagsfri medicin omfattet af listen til behandling af infektioner, som er erhvervet under indlæggelse på sygehus.

Udlevering udover listen

Udover listen kan lægemidler efter lægeligt skøn udleveres til kort tids forbrug efter udskrivning (f.eks. til kvalme- eller smertebehandling) og til færdiggørelse af kortvarende kure (f.eks. antibiotika). Desuden kan sygehuset udlevere lægemidler, der skal indtages indtil behandling kan overgå fra sygehuslæge til praktiserende læge. Der vil endvidere blive udleveret lægemidler, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til begrænset udlevering fra sygehus. En opdateret liste over lægemidler med begrænset udleveringsstatus findes på Sundhedsstyrelsens website www.medicinpriser.dk/default.

	J02 J05A L04A V03A	Svampemidler til systemisk brug Antivirale midler til systemisk brug Immunosupressiva Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling Følgevirkning Behandling, følgevirkning Behandling, følgevirkning
Tuberkulosepatienter	J02 J04A J01MA01 J01MA14	Svampemidler til systemisk brug Midler mod mycobakterier Ofloxacin Moxifloxacin	Behandling Behandling Behandling Behandling
Forebyggelse af hepatisk encefalopati hos patienter med lever sygdom	A07AA11	Rifaximin	Behandling
Hæmofilipatienter	B02AA02 B02BD	Tranexamsyre Blodkoagulationsfaktorer	Behandling Behandling
Nyrepatienter i dialyse samt patienter med "svær nedsat nyrefunktion" svarende til CKD ("chronic kidney disease") stadie 4 og 5, hvilket vil indbefatte eGFR under 30 ml/min	A02A A11CC A12A B01 B03XA B05CB01 B05D B05Z H05BX01 H05BX02 V03AE	Antacida Vitamin D og analoger Calcium Midler mod blodpropper Andre midler mod anæmi Skyllevæsker Peritonealdialysevæsker Hæmodialysekonzentrater Cinacalcet Paricalcitol Midler til behandling af hyperkaliæmi og -fosfatæmi	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter med behov for parenteral ernæring	B05BA	Opløsninger til ernæring, parenteral	Behandling
Patienter med immundefekt	J06BA	Immunoglobuliner, normal human	Behandling
Patienter inficeret med Clostridium difficile	A07AA09 A07AA12	Vancomycin Fidaxomicin	Behandling Behandling

Patienter med hypofysesygdom samt patienter med meget lav højde uden væksthormonmangel. Dette inkluderer fx.Turnerpatienter, patienter med skeletdysplasi, nyreinsufficente patienter, patienter med Prader Willi samt Small for Gestational Age (SGA)	G02CB03 G02CB04 G03B G03C G03F G03G H01A H01BA H01CB H02 H03AA L02AE N04BC01	Cabergolin Quinagolid Androgen Østrogen Gestagener og østrogener i kombination Gonadotropin og andre ægløsningsstimulerende midler Hypofyseforlapshormoner Vasopressin og analoger Antivæksthormon Kortikosteroider til systemisk brug Thyreоideahormoner Gonadotropinfrigørende hormon analoger Bromokriptin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter, som ikke når behandlingsmål for LDL-reduktion med maximalt tolererbet lipidsænkende behandling (skal som minimum skal have forsøgt højdosis statin i kombination med ezetimibe) og som opfylder kriterierne for igangsætning af behandling med PCSK9-hæmmer ift vejledningen fra RADS/Medicinrådet.	C10AX14, C10AX13	Rekombinante humane monoklonale antistoffer til behandling af hyperkolesterolæmi (PCSK9-hæmmer)	Behandling
Patienter med cystinose	A16AA04	Mercaptamin	Behandling
Patienter med kronisk primær binyrebarkinsufficiens	H02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling
Patienter med HIV/AIDS	A01AB A07A J01EC02 J01EE01 J01FF01 J02A J04BA02	Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen Antiinfektionsmidler til tarmen Sulfadiazin Sulfametoaxazole med trimethoprim Clindamycin Svampemidler til systemisk brug Dapsone	Følgevirkning Følgevirkning Behandling af parasitære sygdomme Behandling af parasitære sygdomme Behandling af parasitære sygdomme Følgevirkning Følgevirkning, ikke registreret.

	J05A L03A P01BD01 V03A	Antivirale midler til systemisk brug Immunsystemstimulerende midler Pyrimethamin Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling Behandling, følgevirkning Behandling af parasitære sygdomme Behandling, følgevirkning
Patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram	A06AD	Moviprep	Tarmtømning før undersøgelse
Sklerosepatienter	N07XX07	Fampridin	Behandling af gangbesvær
Patienter med aktiv bindevævssygdom eller autoimmun sygdom, som p.g.a. sygdommens karakter eller udvikling ikke kan behandles af praktiserende speciallæger eller af alment praktiserende læger	L01AA01 L04AX03 L04A	Cyclophosphamid Methotrexate Immunsuppressiva	Behandling Behandling Behandling
Patienter med kronisk viral hepatitis	J05A L03A	Antivirale midler til systemisk brug Immunsystemstimulerende midler	Behandling Behandling
Patienter med multiresistente stafylokokker	A07AA09 D06AX09 D10AF01 J01XC01 J01XX08 J01AA02 J04AB02	Vancomycin Mupirocin Clindamycin Fusidinsyre Linezolid Doxycyclin Rifampicin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter i antitrombotisk behandling i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (op til 35 dage)	B01AB04 B01AB05 B01AB10 B01AX05 B01AE07 B01AF01 B01AF02	Dalteparin Enoxaparin Tinzaparin Fondaparinux Dabigatranetexilat Rivaroxaban Apixaban	Behandling

Patienter i behandling med antitrombotiske lægemidler i tilknytning til obstetrisk behandling. Dette gælder såvel profylaktisk behandling som behandling af eksisterende tromboser (op til 6 uger efter fødsel)	B01AB04 B01AB05 B01AB10	Dalteparin Enoxaparin Tinzaparin	Behandling Behandling Behandling
Antipsykotika til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb	N05AB03 N05AE03 N05AE04 N05AE05 N05AF01 N05AF05 N05AH02 N05AH03 N05AH04 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13	Perphenazin Sertindol Ziprasidon Lurasidon Flupentixol Zuclopentixol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Antipsykotika til psykiatriske patienter med dom til behandling, patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	N05AA02 N05AB02 N05AB03 N05AD01 N05AD03 N05AE03 N05AE04 N05AE05 N05AF01 N05AF03 N05AF05 N05AH02	Levomepromazin Fluphenazin Perphenazin Haloperidol Melperon Sertindol Ziprasidon Lurasidon Flupentixol Chlorprothixen Zuclopentixol Clozapin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling

	N05AH03 N05AH04 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13	Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Anticholinergika til behandling af ekstrapyramidale bivirkninger (EPS), kan være nødvendigt, når der har været forsøg på skift til andet antipsykotisk præparat, nedjustering af dosis uden sufficient effekt og eller fjernelse af EPS	N04AA02 N04AA04 N04AB02 A03BA03	Biperiden Procyclidin Orphenadrin Hyoscyamin (til behandling af hypersalivation ved clozapin behandling)	Følgevirkning Følgevirkning Følgevirkning Følgevirkning
Betablokcer til behandling af bivirkninger som uro og tachycardi, som følgevirkning af antipsykotisk behandling	C07AA05	Propranolol	Følgevirkning
Stemningsstabiliserende præparerter til patienter med bipolar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sygdom), som har dom til behandling, betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling eller patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	N05AN01 N03AF01 N03AF02 N03AG01 N03AX09	Lithium Carbamazepin Oxcarbazepin Valproinsyre Lamotrigin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
ADHD patienter med dom til behandling, eller med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, eller er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	N06BA09	Atomoxitin	Behandling
Antipsykotika til patienter underkastet tvungen opfølging i henhold til psykiatriloven	N05AA02 N05AB02 N05AB03 N05AD01 N05AD03	Levomepromazin Fluphenazin Perphenazin Haloperidol Melperon	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling

	N05AE03 N05AE04 N05AE05 N05AF01 N05AF03 N05AF05 N05AH02 N05AH03 N05AH04 N05AH05 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13	Sertindol Ziprasidon Lurasidon Flupentixol Chlorprothixen Zuclopenthixol Clozapin Olanzapin Quetiapin Asenapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Anticholinergika til behandling af ekstrapyramidale bivirkninger (EPS), som følgevirkninger af antipsykotisk behandling, til patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven	N04AA02 N04AA04 N04AB02 A03BA03	Biperiden Procyclidin Orphenadrin Hyoscyamin (til behandling af hypersalivation ved clozapin behandling)	Behandling Behandling Behandling Behandling
Betablokcer til behandling af bivirkninger som uro og tachycardi, som følgevirkning af antipsykotisk behandling, til patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven	C07AA05	Propranolol	Følgevirkning
Stemningsstabiliserende præparater til patienter med bipolar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sygdom), der er underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven	N05AN01 N03AF01 N03AF02 N03AG01 N03AX09	Lithium Carbamazepin Oxcarbazepin Valproinsyre Lamotrigin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling