

## Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger


*RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne Sklerose, Hepatitis og HIV/AIDS trådte i kraft 1. april 2011.*

Nu udsendes rapporter for 3. kvartal 2011 på lands-, regions- og afdelingsniveau til lægemiddelkomitéer og sygehusapoteker. I dette materiale findes bl.a. forklaringer på nogle af de afvigelser fra målene, som findes i graferne nedenfor. Det er væsentligt at pointere, at der ikke kan konkluderes på målopfyldelsen uden en kvalitativ vurdering af de bagvedliggende data. Den kvalitative vurdering sker i regionerne.

### Sklerose

Udgiften til lægemidler anvendt til primær behandling af Sklerose har på landsplan det seneste år (4. kvartal 2010 - 3. kvartal 2011) været ca. 412 mio. kr. Der er i RADS behandlingsvejledningen kun fastsat behandlingsmål for interferon-beta-1b (Extavia), der udgør ca. 5 % af det samlede forbrug (ca. 300 patienter). Behandlingsmålet er 90 %.

I grafen vises de enkelte regioners målopfyldelse for 3. kvartal 2011.




### HIV/AIDS

Udgiften til lægemidler anvendt til primær behandling af HIV/AIDS har på landsplan det seneste år (4. kvartal 2010 - 3. kvartal 2011) været ca. 330 mio. kr. Der er fastsat behandlingsmål for 1. valgs behandlingen, der udgør ca. 50 % (ca. 2500 patienter) af det samlede forbrug.

Lægemidlerne har været udbudt regionalt for at øge konkurrencen. Regionerne har valgt forskellige behandlingsregimer som 1. valg, da der har været forskel på, hvor fordelagtigt det har været for den enkelte region at vælge enkeltstofbehandling eller kombinationsbehandling. Derfor er der forskellige regionale mål.

For alle regioner gælder, at patienter skal skifte behandling væk fra Atripla. Det betyder, at forbruget skal ligge **under** behandlingsmålet i den enkelte region. Region Sjælland har hjemtaget HIV-behandlingen fra Region Hovedstaden i 2011, hvorfor man først for nylig har været i stand til at fastlægge regionens målsætning for HIV-behandlingen.

I grafen vises de enkelte regioners målopfyldelse for 3. kvartal 2011.



### Hepatitis

Udgiften til lægemidler anvendt til primær behandling af Hepatitis B og C har på landsplan det seneste år (4. kvartal 2010 – 3. kvartal 2011) været 19,9 mio. kr. Der er i RADS behandlingsvejledningen fastsat behandlingsmål for peginterferon (Pegintron) og ribavirin (Rebetol) der udgør henholdsvis ca. 50 % og ca. 10 % af det samlede forbrug. Der behandles ca. 180 patienter med peginterferon og ca. 110 patienter med ribavirin. Behandlingsmålet er henholdsvis 67 % og 50 % i dette kvartal.

I graferne vises de enkelte regioners målopfyldelse for 3. kvartal 2011.

