

Reumatoid arthritis (RA) 2.2

dok. nr.: 122230

Behandlingslængde / lægemiddellevetid	Infliximab	Adalimumab	Certolizumab	Etanercept	Etanercept	Golimumab ^b Sprøjte	Golimumab ^b Pen
Administration	I.V. (vægtafh.) ^a	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.
Dosis uge 0	0,5	1	2	1	2	1	1
1				1	2		
2	0,5	1	2	1	2		
3				1	2		
4		1	2	1	2	1	1
5				1	2		
6	0,75	1	1	1	2		
7				1	2		
8		1	1	1	2		
9				1	2	1	1
10		1	1	1	2		
11				1	2		
12	1	1	1	1	2		
13				1	2	1	1
14		1	1	1	2		
15				1	2		
16		1	1	1	2		
17				1	2	1	1
18		1	1	1	2		
19				1	2		
20	1	1	1	1	2		
21				1	2		
22		1	1	1	2	1	1
23				1	2		
24		1	1	1	2		
25				1	2		
26		1	1	1	2	1	1
27				1	2		
28	1	1	1	1	2		
29				1	2		
30		1	1	1	2	1	1
31				1	2		
32		1	1	1	2		
33				1	2		
34		1	1	1	2		
35				1	2	1	1
36	1	1	1	1	2		
37				1	2		
38		1	1	1	2		
39				1	2	1	1
40		1	1	1	2		
41				1	2		
42		1	1	1	2		
43				1	2	1	1
44	1	1	1	1	2		
45				1	2		
46		1	1	1	2		
47				1	2		
48		1	1	1	2	1	1
49				1	2		
50		1	1	1	2		
51				1	2		
52	1	1	1	1	2	1	1
53				1	2		
54		1	1	1	2		
55				1	2		
56		1	1	1	2	1	1
57				1	2		
58		1	1	1	2		
59				1	2		
60	1	1	1	1	2		
61				1	2	1	1
62		1	1	1	2		
63				1	2		
64		1	1	1	2		
65				1	2	1	1
66		1	1	1	2		
67				1	2		
68	1	1	1	1	2		
69				1	2	1	1
70		1	1	1	2		
71				1	2		
72		1	1	1	2		
73				1	2		
74		1	1	1	2	1	1
75				1	2		
76	0,25	1	1	1	2		
77				1	2		
Totale antal doser indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid	10,000	39,000	42,000	78,000	156,000	18,000	18,000
Legemsvægt (kg)	75,6	0	0	0	0	0	0
Dosisdefinition (eks. mg. el. ml. per dag)	mg/kg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
mg/dosisdefinition	6	40	200	50	25	25	25
Totale forbrug for 78 ugers behandling	4536	1560	8400	3900	3900	450	450
Enhedsstørrelser	100 mg	40 mg	200 mg	50 mg	25 mg	25 mg	25 mg
Enhed	Htgl.	Sprøjte/pen	Inj. Væske opl.	Sprøjte	Sprøjte	Sprøjte	Sprøjte
Antal forbrugte enheder af den givne størrelse indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid	45,36	39	42	78	156	18	18
Noter:	a. Dosis er vægtafhængig indenfor intervaller, som angivet i skemaets kolonner. b. Golimumab gives 1 gang månedligt på samme dato. Dette er i skemaet vist som intervaller af hhv. 4 og 5 uger, svarende til 18 gange totalt.						

Reumatoid arthritis (RA) 2.2

Behandlingslængde / lægemiddellevetid	Tocilizumab	Tocilizumab	Tocilizumab	Rituximab	Abatacept 60 kg < > 100 kg	Abatacept ≤ 60 kg 500 mg	Abatacept 60 kg < > 100 kg 750 mg	Abatacept ≥ 100 kg 1000 mg
Administration	Subcutan Ikke vægtafh.	I.V. (vægtafh.) ^a	I.V. (vægtafh.) ^a	IV Ikke vægtafh.	SC + I.V. (vægtafh.) ^a	I.V. (vægtafh.) ^a	I.V. (vægtafh.) ^a	I.V. (vægtafh.) ^a
Dosis uge 0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1				1			
2	1			1	1			
3	1				1			
4	1	1	1		1	1	1	1
5	1				1			
6	1				1			
7	1				1			
8	1	1	1		1	1	1	1
9	1				1			
10	1				1			
11	1				1			
12	1	1	1		1	1	1	1
13	1				1			
14	1				1			
15	1				1			
16	1	1	1		1	1	1	1
17	1				1			
18	1				1			
19	1				1			
20	1	1	1		1	1	1	1
21	1				1			
22	1				1			
23	1				1			
24	1	1	1		1	1	1	1
25	1				1			
26	1			1	1			
27	1				1			
28	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1				1			
30	1				1			
31	1				1			
32	1	1	1		1	1	1	1
33	1				1			
34	1				1			
35	1				1			
36	1	1	1		1	1	1	1
37	1				1			
38	1				1			
39	1				1			
40	1	1	1		1	1	1	1
41	1				1			
42	1				1			
43	1				1			
44	1	1	1		1	1	1	1
45	1				1			
46	1				1			
47	1				1			
48	1	1	1		1	1	1	1
49	1				1			
50	1				1			
51	1				1			
52	1	1	1	1	1	1	1	1
53	1				1			
54	1			0,923	1			
55	1				1			
56	1	1	1		1	1	1	1
57	1				1			
58	1				1			
59	1				1			
60	1	1	1		1	1	1	1
61	1				1			
62	1				1			
63	1				1			
64	1	1	1		1	1	1	1
65	1				1			
66	1				1			
67	1				1			
68	1	1	1		1	1	1	1
69	1				1			
70	1				1			
71	1				1			
72	1	1	1		1	1	1	1
73	1				1			
74	1				1			
75	1				1			
76	1	0,5	0,5		1	0,5	0,5	0,5
77	1				1			
Totale antal doser indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid	78,000	19,500	19,500	5,923	78,000	19,500	19,500	19,500
Legemsvægt (kg)	0	75,6	75,6	0	0	0	0	0
Dosisdefinition (eks. mg. el. ml. per dag)	mg	mg/kg	mg/kg	mg	mg	mg	mg	mg
mg/dosisdefinition	162	8	8	1000	500	500	750	1000
Totale forbrug for 78 ugers behandling	12636	11793,6	11793,6	5923,077	39000	9750	14625	19500
Enhedsstørrelser	162 mg	400 mg	200 mg	500 mg	250 mg	250 mg	250 mg	250 mg
Enhed	Sprøjt	Htgl.	Htgl.	Htgl.	Htgl.	Htgl.	Htgl.	Htgl.
Antal forbrugte enheder af den givne størrelse indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid	78	29,5	59,0	5,923	78	39	58,5	78
Noter:	a. Dosis er vægtafhængig indenfor intervaller, som angivet i skemaets kolonner. b. Golimumab gives 1 gang månedligt på samme dato. Dette er i skemaet vist som intervaller af hhv. 4 og 5 uger, svarende til 18 gange totalt.							
	Ændringslog: 1.0 - 2010 - Nyt dokument 2.0 - Januar 2014 - Nyt baggrundsnotat 2.1 - Marts 2014 - Ny formulering Golimumab, pen 2.2 August 2015 - Korrektion af dosering for rituximab							