

Beregningsgrundlag for aksial SPA 2.1

Spondylartropier

Behandlingslængde / lægemiddellevetid	78 uger	Infliximab	Adalimumab	Etanercept	Etanercept	Golimumab ^a	Certolizumab
Administration		I.V. (vægtafh.)	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.
Dosis uge 0		1	1	1	2	1	2
1				1	2		
2		1	1	1	2		2
3				1	2		
4			1	1	2	1	2
5				1	2		
6		1	1	1	2		1
7				1	2		
8			1	1	2		1
9				1	2	1	
10			1	1	2		1
11				1	2		
12		1	1	1	2		1
13				1	2	1	
14			1	1	2		1
15				1	2		
16			1	1	2		1
17				1	2	1	
18		1	1	1	2		1
19				1	2		
20			1	1	2		1
21				1	2		
22			1	1	2	1	1
23				1	2		
24		1	1	1	2		1
25				1	2		
26			1	1	2	1	1
27				1	2		
28			1	1	2		1
29				1	2		
30		1	1	1	2	1	1
31				1	2		
32			1	1	2		1
33				1	2		
34			1	1	2		1
35				1	2	1	
36		1	1	1	2		1
37				1	2		
38			1	1	2		1
39				1	2	1	
40			1	1	2		1
41				1	2		
42		1	1	1	2		1
43				1	2	1	
44			1	1	2		1
45				1	2		
46			1	1	2		1
47				1	2		
48		1	1	1	2	1	1
49				1	2		
50			1	1	2		1
51				1	2		
52			1	1	2	1	1
53				1	2		
54		1	1	1	2		1
55				1	2		
56			1	1	2	1	1
57				1	2		
58			1	1	2		1
59				1	2		
60		1	1	1	2		1
61				1	2	1	
62			1	1	2		1
63				1	2		
64			1	1	2		1
65				1	2	1	
66		1	1	1	2		1
67				1	2		
68			1	1	2		1
69				1	2	1	
70			1	1	2		1
71				1	2		
72		1	1	1	2		1
73				1	2		
74			1	1	2	1	1
75				1	2		
76			1	1	2		1
77				1	2		
Totale antal doser (indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid)		14	39	78	156	18	42
Legemsvægt (kg)		78,2					
Dosisdefinition (eks. mg. el. ml. per dag)		mg/kg	mg	mg	mg	mg	mg
mg/dosisdefinition		5	40	50	25	50	200
Totale forbrug for 78 ugers behandling	mg	5474	1560	3900	3900	900	8400
Enhedstørrelse		100 mg	40 mg	50 mg	25 mg	50 mg	200 mg
Enhed		Htgl.	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte
Antal forbrugte enheder af den givne størrelse indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid		54,740	39,000	78,000	156,000	18,000	42,000

Note: ^a Golimumab gives 1 gang månedligt på samme dato. Dette er i skemaet vist som intervaller af hhv. 4 og 5 uger, svarende til 18 gange totalt.