

Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling

Listen har virkning fra den 1. marts 2017

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

A. Behov for tæt styring af medicineringen

En korrekt anvendelse af lægemidlet forudsætter indgående kendskab til patienten samt en omfattende viden om lægemidlet og sygdommen. Denne viden besiddes kun af en specialafdeling. En patient, som lægefagligt kan vurderes som egnet til at blive fulgt fra egen læge eller speciallæge, forudsættes afsluttet til eventuel viderebehandling i primærsektoren.

B. Lægemidler fremstillet specielt til den enkelte patient

Lægemidler der ikke er standardpræparater og som det vil være unødigt besværligt for patienten at skulle rekvirere fra et privat apotek. Lægemidlerne fremstilles typisk kun på sygehusapoteker.

C. Udlevering i henhold til særlige beslutninger

Regeringen har i flere tilfælde klargjort, at bestemte lægemidler skal udleveres vederlagsfrit til ikke indlagte patienter. Det drejer sig om:

- 1) Kytril, Zofran, Vogalene og andre kvalmestillende midler, der anvendes til cancerpatienter.
- 2) Parenteral ernæring til patienter med svært korttarmssyndrom.
- 3) Samtlige udgifter til hjemmedialyse.

D. Lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfrit i en begrænset periode på ca. to år til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb samt til psykiatriske patienter med dom til behandling, selvom disse patienter ikke er indlagt. Ligeledes gælder det patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behand-

ling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling. De sidste nævnte grupper med patienter der er underlagt retslige foranstaltninger omfatter patienter med skizofreni, skizoaffektive psykoser, bipolar affektive sindslidelser og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet). Vederlagsfri medicin kan udleveres svarende til dommens længde. Udleveringen af vederlagsfri medicin skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:

- 1) Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/ Behandlingspsykiatrien,
- 2) behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/ behandlingspsykiatrien eller
- 3) Hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre.

E. Patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven (Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien)

Patienter, der i henhold til psykiatriloven efter udskrivning kan afhentes uden for sygehusregi og bringes ind på psykiatrisk afdeling til tvangsmedicinering, kan få medicin omfattet af listen udleveret vederlagsfrit.

F. Udlevering til kortvarig behandling af akutte potentielt livstruende sygdomme

Patienter med behov for kortvarig antitrombotisk behandling i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (efter individuel vurdering) skal efter dette kriterium fremover have mulighed for at modtage antitromboselægemidler i op til 35 dage vederlagsfrit.

G. Udlevering til patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram

Det er med Kræftplan III aftalt, at alle borgere i alderen 50 – 74 år skal tilbydes screening for tyk- og endetarmskræft begyndende fra 2014. De omhandlede patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med deltagelse i tarmkræftscreeningsprogrammet kan få udleveret lægemidlet Moviprep.

H. Behandling af infektion erhvervet under hospitalsindlæggelse

Patienter kan efter dette kriterium få udleveret vederlagsfri medicin omfattet af listen til behandling af infektioner, som er erhvervet under indlæggelse på sygehus.

Udlevering udover listen

Udover listen kan lægemidler efter lægeligt skøn udleveres til kort tids forbrug efter udskrivning (f.eks. til kvalme- eller smertebehandling) og til færdiggørelse af kortvarende kure (f.eks. antibiotika). Desuden kan sygehuset udlevere lægemidler, der skal indtages indtil behandling kan overgå fra sygehuslæge til praktiserende læge. Der vil endvidere blive udleveret lægemidler, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til begrænset udlevering fra sygehus. En opdateret liste over lægemidler med begrænset udleveringsstatus findes på Sundhedsstyrelsens webside www.medicinpriser.dk/default.

Patientgrupper	ATC-kode	Lægemidler	Særlige betingelser
Cancerpatienter og patienter med maligne hæmatologiske lidelser, (herunder knoglemarvsplanterede)	A 01 AB	Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen	Følgevirkning
	A 03 FA	Propulsiva	Følgevirkning
	A 04	Midler mod kvalme	Følgevirkning
	A 07 A	Antiinfektionsmidler til tarmen	Følgevirkning
	A 07 D	Peristaltikhæmmende midler (Antipropulsiva)	Følgevirkning
	B 01 AC	Blodplade-aggregationshæmmere excl. hepariner	Følgevirkning
	B 01 AB	Heparin-gruppen	Behandling, følgevirkning
	B 02 AA	Aminosyrer (antifibrinolytika)	Følgevirkning
	B 03 XA	Andre midler mod anæmi	Følgevirkning
	G 03 HA	Antiandrogener, usammensatte	Behandling
	H 01 CB	Antivæksthormoner	Behandling
	H 02	Kortikosteroider til systemisk brug	Følgevirkning
	H 05 BX 01	Cinacalcet	Behandling
	J 02 A	Antimykotika til systemisk brug	Følgevirkning
	J 05 A	Antivirale midler til systemisk brug	Behandling
	L 01	Cytostatika	Behandling
	L 02	Hormonterapi	Behandling
	L 03 A	Immunsystemstimulerende midler	Behandling, følgevirkning
	L 04 A	Immunsuppressiva	Behandling
	M 05 B	Midler mod knoglesygdomme	Behandling
V 03 AF	Afgiftningsmidler ved cytostatikabehandling	Behandling, følgevirkning	
H 01CA 03	Histrelin	Behandling	
Transplanterede patienter (organer og knoglemarv)	A 03 FA	Propulsiva	Følgevirkning
	A 05 AA 02	Ursodeoxycholsyre	Følgevirkning
	H 02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling
	J 02	Svampemidler til systemisk brug	Behandling
	J 05 A	Antivirale midler til systemisk brug	Følgevirkning
	L 04 A	Immunsuppressiva	Behandling, følgevirkning
	V 03 A	Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling, følgevirkning
J 01 EE 01	Sulfamethoxazol og trimethoprim	Behandling	
Tuberkulosepatienter	J 02	Svampemidler til systemisk brug	Behandling
	J 04 A	Midler mod mycobakterier	Behandling
	J 01 MA 01	Ofloxacin	Behandling
	J 01 MA 14	Moxifloxacin	Behandling

Forebyggelse af hepatisk encefalopati hos patienter med lever-sygdom	A 07 AA 11	Rifaximin	Behandling
Hæmofilipatienter	B 02 AA 02 B 02 BD	Tranexamsyre Blodkoagulationsfaktorer	Behandling Behandling
Patienter med nyresvigt	A 02 A A 11 CC A 12 A B 01 B 03 XA B 05 CB 01 B 05 D B 05 Z H 05 BX 01 V 03 AE H 05 BX 02	Antacida Vitamin D og analoger Calcium Midler mod blodpropper Andre midler mod anæmi Skyllevæsker Peritonealdialysevæsker Hæmodialysekoncentrater Cinacalcet Midler til behandling af hyperkaliæmi og -fosfatæmi Paricalcitol	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter med behov for parenteral ernæring	B 05 BA	Opløsninger til ernæring, parenteral	Behandling
Patienter med immundefekt	J 06 BA	Immunoglobuliner, normal human	Behandling
Patienter inficeret med Clostridium defficile	A 07 AA 09 A 07 AA 12	Vancomycin Fidaxomicin	Behandling Behandling
Patienter med hypofysesygdom samt patienter med meget lav højde uden væksthormonmangel. Dette inkluderer fx.Turnerpatienter, patienter med skelet-dysplasi, nyreinsufficente patienter, patienter med Prader Willi samt Small for Gestational Age (SGA)	G 02 CB 03 G 02 CB 04 G 03 B G 03 C G 03 F G 03 G H 01 A H 01 BA H 01 CB H 02 H 03 AA L 02 AE N 04 BC01	Cabergolin Quinagolid Androgener Østrogener Gestagener og østrogener i kombination Gonadotropin og andre ægløsningsstimulerende midler Hypofyseforlapshormoner Vasopressin og analoger Antivæksthormon Kortikosteroider til systemisk brug Thyreoideahormoner Gonadotropinfrigørende hormon analoger Bromokriptin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter, som ikke når behandlingsmål for LDL-reduktion med maksimalt tolereret lipidsænkende behandling (skal som minimum skal have forsøgt højdosis statin i kombination med ezeti-mibe) og som opfylder kriterierne for igangsætning af behand-ling med PSK9-hæmmer ift vejledningen fra RADS/Medicinrådet.	C10AX14, C10AX13	Rekombinante humane monoklonale antistoffer til behandling af hyperkolesterolæmi (PCSK9-hæmmer)	Behandling

<p>Patienter med HIV/AIDS</p>	<p>A 01 AB J 01 EC 02 J 01 EE 01 J 01 FF 01 P 01 BD 01 A 07 A J 02 A J 04 BA 02 J 05 A L 03 A V 03 A</p>	<p>Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen Sulfadiazin Sulfametoxazole med trimethoprim Clindamycin Pyrimethamin Antiinfektionsmidler til tarmen Svampemidler til systemisk brug Dapsone Antivirale midler til systemisk brug Immunsystemstimulerende midler Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter</p>	<p>Følgevirkning Behandling af parasitære sygdomme Behandling af parasitære sygdomme Behandling af parasitære sygdomme Behandling af parasitære sygdomme Følgevirkning Følgevirkning Følgevirkning, ikke registreret. Behandling Behandling, følgevirkning Behandling, følgevirkning</p>
<p>Patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram</p>	<p>A 06 AD</p>	<p>Moviprep</p>	<p>Tarmtømmning før undersøgelse</p>
<p>Sklerosepatienter</p>	<p>N 07 XX 07</p>	<p>Fampridin</p>	<p>Behandling af gangbesvær</p>
<p>Patienter med aktiv bindevævssygdom eller autoimmun sygdom, som p.g.a. sygdommens karakter eller udvikling ikke kan behandles af praktiserende speciallæger eller af alment praktiserende læger</p>	<p>L 01 AA 01 L 04 AX 03 L 04 A</p>	<p>Cyclophosphamid Methotrexate Immunsuppressiva</p>	<p>Behandling Behandling Behandling</p>
<p>Patienter med kronisk viral hepatitis</p>	<p>J 05 A L 03 A</p>	<p>Antivirale midler til systemisk brug Immunsystemstimulerende midler</p>	<p>Behandling Behandling</p>
<p>Patienter med multiresistente stafylokokker</p>	<p>A 07 AA 09 D 06 AX 09 D 10 AF 01 J 01 XC 01 J 01 XX 08 J 01 AA 02 J 04 AB 02</p>	<p>Vancomycin Mupirocin Clindamycin Fusidinsyre Linezolid Doxycyclin Rifampicin</p>	<p>Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling</p>
<p>Patienter i antitrombotisk behandling i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling</p>	<p>B01AB04 B01AB05 B01AB10 B01AX05 B01AE07 B01AF01 B01AF02</p>	<p>Dalteparin Enoxaparin Tinzaparin Fondaparinux Dabigatranetexilat Rivaroxaban Apixaban</p>	<p>Behandling</p>

Antipsykotika til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb	N05AB03 N05AE03 N05AE04 N05AE05 N05AF01 N05AF05 N05AH02 N05AH03 N05AH04 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13	Perphenazin Sertindol Ziprasidon Lurasidon Flupentixol Zuclopenthixol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Antipsykotika til psykiatriske patienter med dom til behandling, patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	N05AA02 N05AB02 N05AB03 N05AD01 N05AD03 N05AE03 N05AE04 N05AE05 N05AF01 N05AF03 N05AF05 N05AH02 N05AH03 N05AH04 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13	Levomepromazin Fluphenazin Perphenazin Haloperidol Melperon Sertindol Ziprasidon Lurasidon Flupentixol Chlorprothixen Zuclopenthixol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Anticholinergika til behandling af ekstrapyramidale bivirkninger (EPS), kan være nødvendigt, når der har været forsøg på skift til andet antipsykotisk præparat, nedjustering af dosis uden sufficient effekt og eller fjernelse af EPS	N04AA02 N04AA04 N04AB02 A03BA03	Biperiden Procyclidin Orphenadrin Hyoscyamin (til behandling af hypersalivation ved clozapin behandling)	Følggevirkning Følggevirkning Følggevirkning Følggevirkning

Betablokker til behandling af bivirkninger som uro og tachycardi, som følge af antipsykotisk behandling	C07AA05	Propranolol	Følgevirkning
Stemmingsstabiliserende præparater til patienter med bipolar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sygdom), som har dom til behandling, betingede domme med vilkår om ambulante psykiatriske behandling eller patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulante psykiatriske behandling	N05AN01	Lithium	Behandling
	N03AF01	Carbamazepin	Behandling
	N03AF02	Oxcarbazepin	Behandling
	N03AG01	Valproinsyre	Behandling
	N03AX09	Lamotrigin	Behandling
ADHD patienter med dom til behandling, eller med betingede domme med vilkår om ambulante psykiatriske behandling, eller er prøveløsladt med vilkår om ambulante psykiatriske behandling	N06BA09	Atomoxitin	Behandling
Antipsykotika til patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven	N05AA02	Levomepromazin	Behandling
	N05AB02	Fluphenazin	Behandling
	N05AB03	Perphenazin	Behandling
	N05AD01	Haloperidol	Behandling
	N05AD03	Melperon	Behandling
	N05AE03	Sertindol	Behandling
	N05AE04	Ziprasidon	Behandling
	N05AE05	Lurasidon	Behandling
	N05AF01	Flupentixol	Behandling
	N05AF03	Chlorprothixen	Behandling
	N05AF05	Zuclopenthixol	Behandling
	N05AH02	Clozapin	Behandling
	N05AH03	Olanzapin	Behandling
	N05AH04	Quetiapin	Behandling
	N05AH05	Asenapin	Behandling
N05AL05	Amisulprid	Behandling	
N05AX08	Risperidon	Behandling	
N05AX12	Aripiprazol	Behandling	
N05AX13	Paliperidon	Behandling	
Anticholinergika til behandling af ekstrapyramidale bivirkninger (EPS), som følge af antipsykotisk behandling, til patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven	N04AA02	Biperiden	Behandling
	N04AA04	Procyclidin	Behandling
	N04AB02	Orphenadrin	Behandling
	A03BA03	Hyoscyamin (til behandling af hypersalivation ved clozapin behandling)	Behandling

Betablokker til behandling af bivirkninger som uro og tachycardi, som følge af antipsykotisk behandling, til patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven	C07AA05	Propranolol	Følgevirkning
Stemningsstabiliserende præparater til patienter med bipolar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sygdom), der er underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven	N05AN01 N03AF01 N03AF02 N03AG01 N03AX09	Lithium Carbamazepin Oxcarbazepin Valproinsyre Lamotrigin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling