

Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling

Listen er opdateret den 8. september 2026, og ændringerne træder i kraft den 8. september 2026

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder.
Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

A. Behov for tæt styring af medicineringen

En korrekt anvendelse af lægemidlet forudsætter indgående kendskab til patienten samt en omfattende viden om lægemidlet og sygdommen. Denne viden besiddes kun af en specialafdeling. En patient, som lægefagligt kan vurderes som egnet til at blive fulgt fra egen læge eller speciallæge, forudsættes afsluttet til eventuel viderebehandling i primærsektoren.

B. Udlevering i henhold til særlige beslutninger

Regeringen har i flere tilfælde klargjort, at bestemte lægemidler skal udleveres vederlagsfrit til ikke indlagte patienter. Det drejer sig om:

- 1) Kytril, Zofran, Vogalene og andre kvalmestillende midler, der anvendes til cancerpatienter.
- 2) Parenteral ernæring til patienter med svært korttarmssyndrom.
- 3) Samtlige udgifter til hjemmedialyse.
- 4) Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfrit i op til 15 år efter at diagnosen er stillet til personer med skizofreni, personer med skizotypisk sindslidelse og personer med skizoaffektiv psykose.
- 5) Der kan udleveres vederlagsfri medicin til patienter under behandling i psykiatrien for dobbeltdiagnose herunder samtidig psykiatri og rusmiddellidelse.
- 6) Udlevering af vægttabsmedicin - behandling af overvægt for at muliggøre operation, se særlige betingelser beskrevet i listen.

C. Lægemidler til patienter underlagt retslige foranstaltninger

Patienter der er underlagt retslige foranstaltninger, omfatter patienter med skizofreni, skizoaffektive psykoser, bipolar affektive sindslidelser og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet). Vederlagsfri medicin til behandling af den psykiske lidelse kan udleveres svarende til dommens længde.

D. Udlevering til kortvarig behandling af akutte potentielt livstruende sygdomme

Patienter med behov for kortvarig antitrombotisk behandling i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (efter individuel vurdering) skal efter dette kriterium fremover have mulighed for at modtage antitromboselægemidler i op til 35 dage vederlagsfrit. Dette gælder ligeledes patienter i behandling med antitrombotiske lægemidler i tilknytning til obstetrisk behandling (såvel profylaktisk behandling som behandling af eksisterende tromboser) i op til 6 uger efter fødsel.

E. Udlevering til patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram

Det er med Kræftplan III aftalt, at alle borgere i alderen 50 – 74 år skal tilbydes screening for tyk- og endetarmskræft begyndende fra 2014. De omhandlede patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med deltagelse i tarmkræftscreeningsprogrammet kan få udleveret lægemidlet Moviprep.

F. Medicin til brug før/i forbindelse med koloskopi som udføres på et hospital.

Sygehusbehandling er jf. Sygehusloven gratis for patienten. Det betyder, at patienter, der skal have gennemført en undersøgelse på hospitalet, ikke selv skal betale for lægemidler til brug i forbindelse med undersøgelsen.

G. Udlevering udover listen

- Lægemidler der ikke er standardpræparater og som det vil være unødigt besværligt for patienten at skulle rekvirere fra et privat apotek. Lægemidlerne fremstilles typisk kun på sygehusapoteker.
- Udover listen er der mulighed for at udlevere antibiotika til færdiggørelse af behandling mod hospitalserhvervede infektioner, f.eks. urinvejsinfektion og pneumoni.
- Det er desuden muligt efter lægeligt skøn at udlevere medicin til kort tids forbrug efter udskrivning (f.eks. til kvalme- eller smertebehandling) og til færdiggørelse af kortvarende kure (f.eks. antibiotika).
- Desuden kan sygehuset udlevere lægemidler, der skal indtages, indtil behandling kan overgå fra sygehuslæge til praktiserende læge.
- Der vil endvidere blive udleveret lægemidler, der af Lægemiddelstyrelsen er klassificeret til begrænset udlevering fra sygehus. En opdateret liste over lægemidler med begrænset udleveringsstatus findes på Lægemiddelstyrelsens webside www.medicinpriser.dk/default.
- Lægemidler og frihandelsvarer i ATC-kode V07AB og B05BA03, som skal bruges til færdigblanding af lægemidler, der må udleveres vederlagsfrit (f.eks. til oral opløsning).

Patientgrupper	ACT-kode	Lægemidler	Særlige betingelser	Tilføjet til listen
Cancerpatienter og patienter med maligne hæmatologiske lidelser, (herunder knoglemarvsplanterede)	A01AB	Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen	Følgevirkning	
	A03FA	Propulsiva	Følgevirkning	
	A04	Midler mod kvalme	Følgevirkning	
	A07A	Antiinfektionsmidler til tarmen	Følgevirkning	
	A07D	Peristaltikhæmmende midler (Antipropulsiva)	Følgevirkning	
	B01AC	Blodplade-aggregationshæmmere excl. hepariner	Følgevirkning	
	B01AB	Heparin-gruppen	Behandling, følgevirkning	
	B01AF	Direkte faktor Xa hæmmere	Behandling	
	B02AA	Aminosyrer (antifibrinolytika)	Følgevirkning	
	B03XA	Andre midler mod anæmi	Følgevirkning	
	G03HA	Antiandrogener, usammensatte	Behandling	
	H01CA03	Histrelin	Behandling	
	H01CB	Antivæksthormoner	Behandling	
	H02	Kortikosteroider til systemisk brug	Følgevirkning	
	H05BX01	Cinacalcet	Behandling	
	J01EE01	Sulfamethoxazol og trimethoprim	Behandling	
	J02A	Antimykotika til systemisk brug	Følgevirkning	
	J05A	Antivirale midler til systemisk brug	Behandling	
	L01	Cytostatika	Behandling	
	L02	Hormonterapi	Behandling	
	L03A	Immunsystemstimulerende midler	Behandling, følgevirkning	
	L04A	Immunsuppressiva	Behandling	
	M05B	Midler mod knoglesygdomme	Behandling	
	V03AF	Afgiftningsmidler ved cytostatikabehandling	Behandling, følgevirkning	
Transplanterede patienter (organer og knoglemarv)	A03FA	Propulsiva	Følgevirkning	
	A05AA02	Ursodeoxycholsyre	Følgevirkning	
	H02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling	
	J01EE01	Sulfamethoxazol og trimethoprim	Behandling	
	J02	Svampemidler til systemisk brug	Behandling	

	J05A	Antivirale midler til systemisk brug	Følggevirkning	
	L04A	Immunosuppressiva	Behandling, følgevirkning	
	V03A	Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling, følgevirkning	
Tuberkulosepatienter	J02	Svampemidler til systemisk brug	Behandling	
	J04A	Midler mod mycobakterier	Behandling	
	J01MA01	Ofloxacin	Behandling	
	J01MA14	Moxifloxacin	Behandling	
Forebyggelse af hepatisk encefalopati hos patienter med leversygdom	A07AA11	Rifaximin	Behandling	
Hæmofilpatienter	B02AA02	Tranexamsyre	Behandling	
	B02BD	Blodkoagulationsfaktorer	Behandling	
	H01BA02	Desmopressin injektionsvæske	Behandling	
Nyrepatienter i dialyse samt patienter med "svær nedsat nyrefunktion" svarende til CKD ("chronic kidney disease") stadie 4 og 5, hvilket vil indbefatte eGFR under 30 ml/min	A02A	Antacida	Behandling	
	A11CC	Vitamin D og analoger	Behandling	
	A12A	Calcium	Behandling	
	B01	Midler mod blodpropper	Behandling	
	B03XA	Andre midler mod anæmi	Behandling	
	B05CB01	Skyllevæsker	Behandling	
	B05D	Peritonealdialysevæsker	Behandling	
	B05Z	Hæmodialysekoncentrater	Behandling	
	H05BX01	Cinacalcet	Behandling	
	H05BX02	Paricalcitol	Behandling	
	V03AE	Midler til behandling af hyperkaliæmi og -fosfatæmi	Behandling	
Patienter med behov for parenteral ernæring	B05BA	Opløsninger til ernæring, parenteral	Behandling	
	B05XA14	Natriumglycerol-phosphat	Behandling	April 2024
	B05XA31	Elektrolytter i komb. med andre stoffer	Behandling	April 2024
	B05XC	Vitaminer	Behandling	April 2024
Patienter med immundefekt	J06BA	Immunoglobuliner, normal human	Behandling	
Patienter inficeret med Clostridium difficile	A07AA09	Vancomycin	Behandling	
	A07AA12	Fidaxomicin	Behandling	

Patienter med hypofysesygdom samt patienter med meget lav højde uden væksthormonmangel. Dette inkluderer fx.Turnerpatienter, patienter med skeletdysplasi, nyreinsufficiente patienter, patienter med Prader Willi samt Small for Gestational Age (SGA)	G02CB03	Cabergolin	Behandling	
	G02CB04	Quinagolid	Behandling	
	G03B	Androgener	Behandling	
	G03C	Østrogener	Behandling	
	G03D	Progestogener	Behandling	April 2024
	G03F	Gestagener og østrogener i kombination	Behandling	
	G03G	Gonadotropin og andre ægløsningsstimulerende midler	Behandling	
	H01A	Hypofyseforlapshormoner	Behandling	
	H01BA	Vasopressin og analoger	Behandling	
	H01CB	Antivæksthormon	Behandling	
	H02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling	
	H03AA	Thyreoideahormoner	Behandling	
	L02AE	Gonadotropinfrigørende hormon analoger	Behandling	
	N04BC01	Bromokriptin	Behandling	
Patienter, som ikke når behandlingsmål for LDL-reduktion med maximalt tolereret lipidsænkende behandling (skal som minimum skal have forsøgt højdosis statin i kombination med ezetimibe) og som opfylder kriterierne for igangsætning af behandling med PSK9-hæmmer ift vejledningen fra RADS/Medicinrådet.	C10AX13	Evolocumab	Behandling	April 2024
	C10AX14	Alirocumab	Behandling	April 2024
	C10AX16	Inclisiran	Behandling	April 2024
Patienter med cystinose	A16AA04	Mercaptamin	Behandling	
Patienter med kronisk primær binyrebarkinsufficiens	H02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling	
Patienter med HIV/AIDS	A01AB	Antiinfektiva til lokal brug i mundhulen	Følgervirkning	
	A07A	Antiinfektionsmidler til tarmen	Følgervirkning	
	J01EC02	Sulfadiazin	Behandling af parasitære sygdomme	
	J01EE01	Sulfametoxazole med trimethoprim	Behandling af parasitære sygdomme	

	J01FF01	Clindamycin	Behandling af parasitære sygdomme	
	J02A	Svampemidler til systemisk brug	Følggevirkning	
	J04BA02	Dapsone	Følggevirkning, ikke registreret.	
	J05A	Antivirale midler til systemisk brug	Behandling	
	L03A	Immunsystemstimulerende midler	Behandling, følggevirkning	
	P01BD01	Pyrimethamin	Behandling af parasitære sygdomme	
	V03A	Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling, følggevirkning	
Patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram	A06AD	Moviprep	Tarmtømning før undersøgelse	
Patienter, der skal koloskoperes på hospital	A06AB	Kontaktlaksantia	Tarmtømning før undersøgelse	
	A06AD	Osmotisk virkende laksantia	Tarmtømning før undersøgelse	
	A06AG	Laksantia med lokal virkning i rectum	Tarmtømning før undersøgelse	
Sklerosepatienter	N07XX07	Fampridin	Behandling af gangbesvær	
Patienter med aktiv bindevævssygdom, inflammatorisk eller autoimmun sygdom, som pga. sygdommens karakter eller udvikling ikke kan behandles af praktiserende speciallæger eller af alment praktiserende læger	D11AH05	Dupilumab	Behandling	Maj 2024
	D11AH08	Abrocitinib	Behandling	April 2024
	J01EE01	Sulfamethoxazol med trimetoprim	Behandling	31. januar 2025
	L01AA01	Cyclophosphamid	Behandling	
	L04AX03	Methotrexate	Behandling	
	L04A	Immunsuppressiva	Behandling	
Patienter med kronisk viral hepatitis	J05A	Antivirale midler til systemisk brug	Behandling	
	L03A	Immunsystemstimulerende midler	Behandling	
Patienter med multiresistente stafylokokker	A07AA09	Vancomycin	Behandling	
	D06AX09	Mupirocin	Behandling	
	D10AF01	Clindamycin	Behandling	
	J01FA09	Clarithromycin	Behandling	September 2024

	J01MA14	Moxifloxacin	Behandling	September 2024
	J01XC01	Fusidinsyre	Behandling	
	J01XX08	Linezolid	Behandling	
	J01AA02	Doxycyclin	Behandling	
	J04AB02	Rifampicin	Behandling	
Patienter i antitrombotisk behandling i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (op til 35 dage)	B01AB04	Dalteparin	Behandling	
	B01AB05	Enoxaparin	Behandling	
	B01AB10	Tinzaparin	Behandling	
	B01AX05	Fondaparinux	Behandling	
	B01AE07	Dabigatranetexilat	Behandling	
	B01AF01	Rivaroxaban	Behandling	
	B01AF02	Apixaban	Behandling	
Patienter i behandling med antitrombotiske lægemidler i tilknytning til obstetrisk behandling. Dette gælder såvel profylaktisk behandling som behandling af eksisterende tromboser (op til 6 uger efter fødsel)	B01AB04	Dalteparin	Behandling	
	B01AB05	Enoxaparin	Behandling	
	B01AB10	Tinzaparin	Behandling	
Patienter med eosinofil øsofagitis, som har klinisk og histologisk behandlingssvigt	A07EA06	Budesonid smeltetabletter	Behandling	
Antipsykotika til patienter med skizofreni, skizotypisk sindslidelse og skizoaffektiv psykose (i op til 15 år efter at diagnosen er stillet)	N05AB03	Perphenazin	Behandling	
	N05AE03	Sertindol	Behandling	
	N05AE04	Ziprasidon	Behandling	
	N05AE05	Lurasidon	Behandling	
	N05AF01	Flupentixol	Behandling	
	N05AF05	Zuclopenthixol	Behandling	
	N05AH02	Clozapin	Behandling	
	N05AH03	Olanzapin	Behandling	
	N05AH04	Quetiapin	Behandling	
	N05AL05	Amisulprid	Behandling	
	N05AX08	Risperidon	Behandling	

	N05AX12	Aripiprazol	Behandling	
	N05AX13	Paliperidon	Behandling	
	N05AX15	Cariprazin	Behandling	
	N05AX16	Brexpiprazol	Behandling	
Antipsykotika til psykiatriske patienter med dom til behandling, patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	N05AB03	Perphenazin	Behandling	
	N05AD01	Haloperidol	Behandling	
	N05AD03	Melperon	Behandling	
	N05AE03	Sertindol	Behandling	
	N05AE04	Ziprasidon	Behandling	
	N05AE05	Lurasidon	Behandling	
	N05AF01	Flupentixol	Behandling	
	N05AF05	Zuclopenthixol	Behandling	
	N05AH02	Clozapin	Behandling	
	N05AH03	Olanzapin	Behandling	
	N05AH04	Quetiapin	Behandling	
	N05AL05	Amisulprid	Behandling	
	N05AX08	Risperidon	Behandling	
	N05AX12	Aripiprazol	Behandling	
	N05AX13	Paliperidon	Behandling	
	N05AX15	Cariprazin	Behandling	
	N05AX16	Brexpiprazol	Behandling	
Antikolinergika til kortvarig behandling af ekstrapyramidale bivirkninger (EPS), hvor man vælger at se an før dosisreduktion eller skift af præparat.	N04AA02	Biperiden	Følgevirkning	
Betablokker til behandling af bivirkninger som uro og tachycardi, som følgevirkning af antipsykotisk behandling	C07AA05	Propranolol	Følgevirkning	
Stemningsstabiliserende præparater til patienter med bipolar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sygdom), som har dom til behandling, betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk	N05AN01	Lithium	Behandling	
	N03AF01	Carbamazepin	Behandling	
	N03AF02	Oxcarbazepin	Behandling	

behandling eller patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	N03AG01	Valproinsyre	Behandling	
	N03AX09	Lamotrigin	Behandling	
ADHD patienter med dom til behandling, eller med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, eller er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	C02AC02	Guanfacin	Behandling	April 2024
	N06BA02	Dexamfetamin	Behandling	April 2024
	N06BA04	Methylphenidat	Behandling	
	N06BA09	Atomoxetin	Behandling	
	N06BA12	Lisdexamfetamin	Behandling	April 2024
Patienter med Lennox-Gastauts syndrom, Dravets syndrom eller anden svær epilepsi	N03AX24	Cannabidiol	Behandling	
Patienter med dobbeltdiagnose som behandles for samtidig psykiatri og rusmiddellidelse	N07BB05	Nalmefen	Behandling	10. december 2024
	N07BB03	Acamprosac	Behandling	10. december 2024
	N07BB04	Naltrexon	Behandling	10. december 2024
	N07BB01	Disulfiram	Behandling	10. december 2024
	N07BC01	Buprenorphin	Behandling	10. december 2024
	N07BC51	Buprenorphin, Naloxon	Behandling	10. december 2024
	N07BC02	Methadon	Behandling	10. december 2024
	N02AA01 (Udelukkende depot præparater)	Depot morfin	Behandling	10. december 2024
	N05BA	Benzodiazepiner	Behandling	10. december 2024
Patienter der har behov for vægttab for at kunne gennemføre en kritisk operation. <u>Gruppen af operationer er:</u> • Organtransplantationer • Brystrekonstruktion og mastektomi (risikoreducerende operationer på kvinder med høj risiko for brystkræft ofte BRCA1 mutationer) • Pouch-kirurgi ved colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse)	A10BJ06	Semaglutid	Behandling	8. september 2026
	A10BX16	Tirzepatid	Behandling	8. september 2026

• Stomifremlægning og -tilbagelægning • Diafragmaplastik <u>Alle følgende betingelser være opfyldt:</u> • Patienter med svær overvægt (BMI>35 kg/m²), og • hvor et vægttab på 5-20 pct. af den totale kropsvægt vurderes at kunne medføre enten at operationen teknisk kan gennemføres eller, at operationen vurderes gennemført med markant reduktion af risiko for perioperative komplikationer, og • at patienten forinden har forsøgt at opnå det nødvendige vægttab gennem livstilsændringer <u>Længde af behandling:</u> • Behandlingen ophører når målet for at få udført operationen er nået. Hvis behandlingen strækker sig over 6 måneder, bør den behandlende læge vurdere, om vægttabsmålet fortsat er realistisk, eller behandlingen bør stoppes • Behandlingen tilbydes kun op til operationen og ikke efter operationen				
--	--	--	--	--